

FERQUIM S.A. DE C.V.
A LA VANGUARDIA EN
NUTRICION VEGETAL



Programa

FRESA

www.ferquim.mx



Uno de los aspectos que más importantes que incide en el rendimiento de la **FRESA** es la nutrición, principalmente cuando inicia la floración y el llenado de fruta. En muchas zonas productoras, la fertilización de este cultivo se realiza en forma tradicional, debido a que no existe información precisa que permita establecer con seguridad los requerimientos nutricionales del cultivo y las dosis óptimas de nutrientes con **BALANCE** adecuado.

Se conocen 16 elementos químicos esenciales para el crecimiento de las plantas, divididos en dos grupos principales; no minerales y minerales.

Nuestro programa se distingue a otros debido a nuestras formulas balanceadas contienen los mayores nutrimentos incorporados a nuestro producto para que el incremento de su producción **sea mayor.**

REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES PARA PRODUCIR FRESA

N	P	K	Ca	S	Mg
1.8-2.2	0.8-1.2	2.5-3-5	0.7-0.8	0.21-0.3	0.17-0.19
Mn	Fe	Cu	Zn	Bo	Mo

Este grupo importante de elementos tienen un rol a nivel de enzimas, ya sea participando como enlace en los quelatos, Cobre, Magnesio, Sodio, Hierro, Manganeso, Zinc, Molibdeno, Calcio (Cu, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, Mo, Ca), siendo un ejemplo típico la formación de la molécula de clorofila con Mg como enlace.

*nutrición del aguacate presentados y aplicaciones
Samuel Salazar-García

PROGRAMA DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FERQUIM AL SUELO INICIO DE PLANTACION

• EPOCA DE APLICACIÓN	• PRODUCTO	• DOSIS
<ul style="list-style-type: none"> • PRE-ABONADO antes de plantar al fondo del surco 	<ul style="list-style-type: none"> • BALANCE PLUS (fertilizante granulado de base) • + Balance Natura (composta orgánica) 	<ul style="list-style-type: none"> • 300-500 kgs./ ha. • 5-10 Tns./ ha.
<ul style="list-style-type: none"> • 15 días después de trasplante 	<ul style="list-style-type: none"> • FOLIGRAL NATURA (Bío- mejorador de suelo orgánico) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 LTS. / ha
<p>Desarrollo vegetativo-inicio de floración</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 semanas • BALANCE EXTRA (fertilizante soluble) • 06 semanas • BALANCE EXTRA 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 KGS./Ha. / Semana • 40 KGS./Ha. / Semana
<ul style="list-style-type: none"> • Emergencia de hojas • Inicio de floración • Llenado de fruta 	<ul style="list-style-type: none"> • BALANCE extra • BALANCE extra • BALANCE extra 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 kgs./ha • 60 kgs./ha • 80 kgs./ha



PROGRAMA DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FERQUIM AL FOLLAJE

ETAPA FENOLÓGICA	PRODUCTO	DOSIS	N° DE APLICACIONES	APLICACIÓN ETAPA FENOLOGICA	OBJETIVO
20 DIAS DESPUES DE TRASPLANTE	FOLIGRAL TOTAL (fert.foliar correctivo) + PROKELP (aminoácidos de algas marinas)	1/2 lt/ Ha. 1/2 lt/ Ha.	1	Contemplando la expansión de las raíces	Estimulación del cogollo de la planta en su formación de follaje
INICIO FLORACION-FRUCTIFICACION	FOLIGRAL TOTAL (fert.foliar correctivo)	2 lt./ Ha.	3	Aplicaciones para desarrollar flor y fruto	Tener mayor número de frutas efectivas y con más grados brix.



Medidas correctivas para PH y Materia orgánica en Suelo.

El pH más adecuado para un buen desarrollo del cultivo oscila entre 6-6.5 Ligeramente ácido, de acuerdo a la materia orgánica si es baja se debe agregar **BALANCE NATURA** (composta) Y se sugiere que antes de la plantación hacer los agregados se hagan las aplicaciones de fertilizante de base y la composta. La aplicación de PROKELP y las bacterias de **FOLIGRAL NATURA** se realizan una vez que se instaló la plantación para ayudar a su rápido desarrollo. Fertilizante de base y la composta. La aplicación de PROKELP y las bacterias de FOLIGRAL NATURA se realizan una vez que se instaló el trasplante, para ayudar a su rápido desarrollo.

NUTRIENTES Y SU FUNCIÓN DENTRO DE LA PLANTA

NITROGENO

Es transportado por el xilema en forma de nitrato simultáneamente incrementa la síntesis de los aniones orgánicos con la acumulación de cationes inorgánicos como Ca, Mg, K, y Na en la raíz. Después de la absorción, el nitrato puede permanecer en las vacuolas o incorporado en moléculas orgánicas. El nitrato es reducido e incorporado dentro de las moléculas orgánicas para activar ligeramente la enzima nitrato reductasa (NR). El amonio es rápidamente incorporado dentro de las moléculas orgánicas

FOSFORO

Es convertido a fósforo orgánico (hexose-phosphates y uridine diphosphate) muy rápidamente metabolizado. Es transportado por el floema como inorgánico o como fósforo orgánico (phosphatidylcholine) un porcentaje significativo de este fósforo orgánico (85-90%) permanece en las vacuolas, como ortofosfato. Nuestros niveles regulan la actividad de enzimas como fosfofructokinasa y ADP-glucosa pirofosforilasa y son importantes en el control de síntesis y la respiración .

Interactúa con el N, Ca, Mg, Al, Fe y Zn.

POTASIO

Es tomado por la raíz o vía foliar con Foligral y transportado por el xilema a través de las hojas jóvenes. Permite mantener el estatus de agua y controla la operación de apertura y cierre de estomas. Actúa también en forma indirecta en la actividad fotosintética. Es principal nutriente cuando interviene en la formación de azúcares. Interactúa con N, Ca, Mg, Na.

CALCIO

Es transportado por el xilema, pero se limita si existe baja humedad relativa, ya que su movilidad se realiza por tejidos meristemáticos. El calcio es también transportado por el floema pero en cantidades pequeñas. El calcio se localiza en las vacuolas. Interactúa con N, P, Fe, Mn, B, Zn y Al.

MAGNESIO

Es movido por el floema a través las hojas jóvenes. Desde tejidos y fruto dependen de este mineral, contiene dos cargas positivas, y es de los cationes más importantes. Estabiliza los ribosomas en una configuración adecuada para la síntesis de proteína. Es esencial para la actividad de dos de las principales enzimas fijadoras de CO₂ ribulosa fosfato carboxilasa y fosfenolpiruvato carboxilasa.

Interactúa con K, amonio, Ca ; Na, Mn.

AZUFRE

Es traslocado por el xilema en forma de sulfato, el azufre se mueve en el floema y es reducido para su redistribución por la raíz y pecíolos de tejidos jóvenes. Cuando es reducido a sulfato es incorporado a los aminoácidos cisteína, cistina o metionina. Esta reducción es la más prominente en las membranas de los cloroplastos de los tejidos verdes, especialmente durante las horas de mayor luminosidad. Una de las más importantes proteínas que contienen azufre es el ferredoxin, cual se involucra en la asimilación de CO₂ y en la síntesis de glucosa.

Interactúa con N, P.

BORO

Colocado en los espacios libres de la raíz, este es asociado con los polisacáridos; el boro es transportado principalmente por el xilema y su función está relacionada en el crecimiento meristemático, diferenciación celular, maduración, división y elongación. Aumenta la absorción de azúcar, metaboliza e incrementa la respiración. Interactúa con P, K, Ca.

COBRE

Es transportado por el xilema con componentes nitrogenados y algunos Aminoácidos; es encontrado en diversas enzimas que tienen influencia en carbohidratos y en el metabolismo del nitrógeno en las plantas.

Interactúa con N, P, K, Fe, Zn, Mn, Mo, Al.

FIERRO

Esencialmente está relacionado con los cambios de estado oxidación – reducción; es transportado por el xilema principalmente en los cloroplastos. El Hierro también es parte de la proteína ferredoxina que es requerida para la reducción de nitratos.

Interactúa con N, P, K, B, Cu, Mn.

MANGANESO

Está involucrado en los procesos de oxidoreducción y sirve como cofactor de las enzimas nitrato reductasa, hidroxilamina reductasa, indolacético oxidasa, RNA polimerasa, fofocinasa y fosfotransferasa; es trasladado por el xilema combinado con ácidos orgánicos, preferentemente hacia los tejidos meristemáticos. Interactúa con N, P, Mg, Fe.

MOLIBDENO

Es un componente esencial de dos enzimas nitrato reductasa y Nitrogenasa. Es un catalizador en la conversión de nitrato a nitrito durante el proceso de asimilación de la reducción del nitrato. Interactúa con P, sulfatos

ZINC

Es transportado cruzando la raíz hacia la endodermis en el simplasto a el xilema, presente en las enzimas promotoras de la hidrolisis y reacciones de hidratación dentro de los grupos carbonilos. Es localizado en el citoplasma de los cloroplastos donde son catalizadas las reacciones entre el CO_2 y H_2O .

Interactúa con P, Fe.



El equilibrio en la nutrición de plantas, es un parámetro decisivo que influye totalmente en nuestro rendimiento. Permita que le proporcionemos ese

Balance M.R. a su plantación



Michoacán ☎ 800-6490197 • Jalisco 📞 33-29253162
www.ferquim.mx

Quality Certificate